




Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 19

Freitag, 16.05.2025

Entwicklungsstadium/Witterung: Frühe Kischensorten wie z.B. Burlat befinden sich zum Teil bereits im Farbumschlag (grün/gelb). Der Apfel ist überwiegend im Stadium BBCH 71 bis 72. Je nach Prognosemodell kann es morgen zu leichten Niederschlägen kommen. Allgemein soll die Schönwetterperiode bis zum Anfang der kommenden Woche anhalten.

Veranstaltungshinweis:

Am 28.05.2025 findet am KOB zusammen mit dem LTZ ein Applikationsworkshop und eine Vorstellung von Captan-Alternativstrategien im Hopfengebiet statt. Bisher wurde die Mindestteilnehmeranzahl nicht erreicht. Bei Interesse melden Sie sich bitte **bis zum 20.05.2025** über die folgende E-Mail-Adresse an. (veranstaltungen@kob-bavendorf.de)

Kernobst

Schorf: Mittlerweile werden die Symptome der jüngeren Schorfinfektionen sichtbar. Führen Sie Kontrollen auf Schorfbefall durch, um sich einen Überblick im eigenen Betrieb zu verschaffen. Bei anstehenden Maßnahmen vor gemeldeten Niederschlägen ein Belagsfungizid (Captan-/ Dithianon-haltig) ausbringen. Halten Sie ggf. die nötigen Abstände zwischen den Behandlungen ein. Beachten Sie die B1-Einstufung von Captan-haltigen Produkten.

Mehltau: Die Schönwetterperiode bringt gute Bedingungen für Mehltauinfektionen. Planen Sie deshalb eine Behandlung mit einem Mehltaufungizid wie z. B. Talendo oder Nimrod EC ein, falls noch keine Mehltaubehandlung durchgeführt wurde.

Apfelwickler: Führen Sie eine Behandlung mit Granulosevieren durch (3/10 Aufwand).
Siehe Warndienst 18 vom 13.05.2025

Steinobst

Kirschfruchtfliege (KFF): Vereinzelt hat der Flug eingesetzt. Kontrollieren Sie Ihre Anlagen. Um den Anforderungen des LEH gerecht zu werden, sollte die Mospilan SG Behandlung **spätestens 28 Tage Vorernte** durchgeführt werden. Für die Frühsorte Burlat wird derzeit Mitte Juni als Erntetermin erwartet. Wenn diese Behandlung notwendig ist, sollte sie zeitnah erfolgen. Bei Ware für die Direktvermarktung sollte der Flug ebenfalls kontrolliert werden. Hier kann die erste Mospilan SG Behandlung bis 21 Tage Vorernte eingeplant werden.

Pflaumensägewespe: Im Gebiet wurde vermehrt Befall der Pflaumensägewespe festgestellt. Zum derzeitigen Zeitpunkt ist eine Behandlung nicht mehr wirksam. Vermerken Sie sich befallene Anlagen und planen Sie eine Behandlung zur Blüte im Folgejahr ein.

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau/ Pflanzenschutzdienst des LRA Bodenseekreis

Tel.: 0751-7903-305; Mobil: 0176-7276 87 75 (Herr Haltmaier); Tel.: 0751-7903-306; Mobil: 0176 21184398 (Herr Bischoff).

Die Angaben ersetzen nicht die Gebrauchsanleitung; insbesondere sind die Anwendungsbestimmungen zu beachten. Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Kenntnisstand der Verfasser. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben sowie eine Haftung für Irrtümer oder Nachteile, die sich aus der Empfehlung bestimmter Präparate oder Verfahren ergeben könnten, wird nicht übernommen.