


Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 11

Sonntag, 16.04.23

Entwicklungsstadium/Witterung: Früh blühende Birnen wie Xenia sind an frühen Standorten aufgeblüht. Der Apfel hat an Sorten wie Idared, Braeburn, Kanzi und Jonagold das BBCH-Stadium 57 (= Rote Knospe) bei bis zu 50 % der Blütenknospen erreicht. Die Niederschläge sollen heute noch weitergehen und bis morgen, am Vormittag anhalten. Ab Dienstag ist unter windigen Bedingungen vorübergehend Abtrocknung zu erwarten. Ab Donnerstag ist wieder unbeständige Witterung gemeldet.

Kernobst

Schorfsituation:

- Die Niederschlagsmengen lagen im Gebiet gestern zwischen 5 und 13 mm und heute in Summe zwischen 20 und 38 mm. An sieben von 13 Stationen wurden bis heute, 14:00 Uhr Niederschlagsmengen von mehr als 25 mm gemessen. Vier dieser Stationen zeigten über 30 mm Regen.
- In Gebieten mit Niederschlagsmengen über 25 mm (weitere, prognostizierte Niederschlagsmengen einkalkulieren) lässt die Wirkung der vorbeugenden Behandlung deutlich nach.
- Der Blattzuwachs ist derzeit mäßig, aber sichtbar.
- Am Standort Riedheim wurden gestern, mit Regenbeginn um ca. 18:30, einzelne Sporen gefangen, ab heute in der Früh wurden 2800 Sporen ausgestoßen. Der Flug hält noch an. Dieser Sporenausstoß ist als stark bis sehr stark zu werten.
- Der Schorfpilz ist nach Prognosemodell Farmmet in der Phase der maximalen Ascosporennachreife (90-100%).
- Belagsbehandlungen wurden zuletzt zwischen Donnerstag und Samstag durchgeführt.

Empfehlung:

- In Gebieten mit Niederschlägen über 25 mm sollte insbesondere in Schof-kritischen Anlagen eine Behandlung in die laufende Infektion erfolgen. Dies gilt besonders für solche, kritischen Anlagen, die Donnerstag zuletzt behandelt wurden.
- Die Behandlungen sollten spätestens morgen, am Vormittag beendet werden.
- Verwenden sie ein Delan-haltiges oder Captan-haltiges Produkt oder Curatio (8,0 l/ha/m). Curatio ist in dieser Situation das stärkste Produkt beim Einsatz auf das nasse Blatt. Alternativ Einsatz eines Dodine-haltigen Produktes mit vorzugsweiser Anwendung auf das abtrocknende Blatt. Hinweis: Der Wirkstoff Dodine darf nur 1x/Saison unabhängig des gewählten Produktes angewendet werden.
- Soll zum Anfang dieser Woche geölt werden, ist ein Dodine-haltiges Präparat zu bevorzugen.