


Pflanzenschutz - Warndienst Bodensee

Übergebieliche Pflanzenschutzberatung Obstbau
des Landwirtschaftsamtes Bodenseekreis am KOB-Bavendorf



Obstbau

Nr. 14

Montag, 24.04.23

Entwicklungsstadium/Witterung: Frühe Zwetschensorten sind bereits überwiegend abgeblüht. Frühe bis mittlere Süßkirschen werden in dieser Woche allgemein in Vollblüte stehen. Im Gebiet sind zum Wochenende an frühen bis mittleren Standorten Apfelsorten wie Jonagold und Kanzi aufgeblüht. Heute soll es ab Mittag abtrocknen, der aktuell böige Wind soll gegen Abend nachlassen. Morgen sind ab dem frühen Vormittag Niederschläge gemeldet. Nach einem trockenen Mittwoch und Donnerstag sollen ab Freitag erneut anhaltend Niederschläge fallen.

Schorf:

Situation:

- Das Maß für die Fähigkeit des Schorfpilzes Ascosporen nachzuliefern, liegt heute bei 80% und nimmt weiter ab.
- Der Blattzuwachs von Samstagmittag auf heute (am Vormittag), betrug in wüchsigen Anlagen und Sorten $\frac{1}{2}$ Blatt an den Langtrieben. Diese Blätter und der Zuwachs an den Rosettenblättern der Blütenbüschel sind ab jetzt nicht ausreichend geschützt.
- Seit Samstag fielen im Gebiet unterschiedlich Niederschläge zwischen 3,0 bis 11,0 mm. In Riedheim regnete es am Sonntag in der Früh und dann erst gegen Abend wieder. In Bavendorf waren die Niederschläge am Sonntag ergiebiger und fielen auch tagsüber.
- Der Sporenausstoß in Riedheim betrug dementsprechend am Sonntag 220 Sporen. Heute, bis 9:30 Uhr wurden weitere 100 Sporen (Flug anhaltend) ausgezählt.
- In Bavendorf, mit Tagesniederschlägen, wurden hingegen gestern 1000 Sporen und heute, bis 11:30 Uhr, weitere 800 Sporen ausgezählt (Flug anhaltend).
- Mit den prognostizierten Niederschlägen morgen (tagsüber) wird ein allgemein starker Ascosporenausstoß erwartet.

Empfehlung:

- Insbesondere in schorfkritischen Sorten und Anlagen sollte heute oder morgen eine Zwischenbehandlung durchgeführt werden.
- Heute soll es gegen Abend windstill werden. Dann kann ein Belagsfungizid eingesetzt werden.
- Alternativ, bei eintretender Prognose, morgen eine Behandlung in die laufende Infektion einplanen. Hierfür ist Curatio (8,0 l/ha/m; Einsatz bis Blühende, max. 6x; danach 6 l/ha/m; max. 9x; Art. 53) besonders geeignet.